

| | | |
|--|--|---|
| Collège Bilingue DAVID-AUGUSTIN | | République du Cameroun Année scolaire 2025-2026 |
| DÉPARTEMENT DE: PCT SESSION INTENSIVE : OCTOBRE 2025 | | CLASSE : T ^{le} C/D |
| EPRÉUVE DE : PHYSIQUE | | DUREE : 3H Coeff. :4/3 |
| VISA DE L'AP : | | EXAMINATEUR: M. DJIOKENG |

Partie A : Evaluation des ressources

/ 24 points



STARTUP EDUCATION

Exercice 1 : Vérification des savoirs /8points

1. Définir : a) analyse dimensionnelle b) champ de gravitation terrestre. 2pt
 2. Enoncer la loi d'attraction universelle. 2pt
 3. Un avion survolant la Terre subit un champ de gravitation $\vec{g} = -\frac{GM}{(R+h)^2} \vec{u}$. Justifier le signe moins (-) de cette formule et expliciter les termes de cette expression. 1,5pt
 4. Citer trois grandeurs dérivées de votre choix et leurs dimensions. 1,5pt
 5. **Répondre par vrai ou faux :** 1pt
- 1.1 La gravitation est l'interaction entre des corps.
 - 1.2 Le champ de gravitation est inversement proportionnel à la distance de son influence.

Exercice 2 : Application des savoirs /8points

A- Analyse dimensionnelle



STARTUP EDUCATION

- a- La formule $E=\sqrt{PC^2+m^2C^4}$ est-elle homogène ? Justifier.

E : énergie ; P : quantité de mouvement ; m : masse ; C : vitesse de la lumière. 1,5pt

B- Force et champ de pesanteur

1. Calculer l'intensité du champ de gravitation terrestre à la surface de la terre. 1,5pt
2. Calculer l'intensité de la force de gravitation que la terre exerce sur une voiture de masse m = 2 tonnes placée sur la surface de la terre. 1pt

Données de la terre : masse M = $5,97 \times 10^{24}$ kg ; rayon R = 6371 km ; G = $6,67 \times 10^{-11}$ USI

C- Gravitation

On considère la terre à répartition sphérique de masse M_T , de centre O et de rayon R_T . Soit un objet ponctuel de masse m gravitant à une altitude z au-dessus de la terre.

1. Représenter sur un schéma claire la terre, l'objet ponctuel, la force de gravitation F que subit l'objet, le champ de gravitation terrestre g que subit l'objet et quelques lignes de champ de gravitation terrestre. 2pt
2. Donner l'expression vectorielle de g. on représentera le vecteur unitaire. 1pt
3. A partir de l'expression de l'intensité de F et de l'analyse dimensionnelle, déterminer l'unité dans le système de base de la grandeur « G » y figurant. 1pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs /8points

A- Analyse dimensionnelle



La vitesse d'un satellite en orbite circulaire autour de la terre à une altitude z au-dessus de la

mer est $V = \frac{R^\alpha g^\beta}{\sqrt{R+z}}$, avec l'intensité du champ de pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

- 1.1. Trouver les coefficients α et β par l'analyse dimensionnelle. **1,5pt**

- 1.2. Calculer la valeur de V pour $z = 36000 \text{ km}$ et le rayon de la terre $R = 6380 \text{ km}$. **1,5pt**

B- Champ gravitationnel

ABC est un triangle rectangle isocèle en B de côté AB = a = 10 m. on place en A Archangel de masse mA = 40 kg et en C Carole de masse mC = 30 kg. Boris est placé en B.

1. Représenter sur un schéma le champ gravitationnel résultant que subit Boris de la part de Archangel et Carole, puis déterminer ses caractéristiques. **2,5pt**
2. A quelle distance x de Archangel doit se placer Boris sur le segment AC pour que le champ gravitationnel résultant sur Boris soit nul ? **2,5pt**

Partie B : Evaluation des compétences / 16 points

VANELLE désire déterminer la nature d'une planète du système solaire et savoir pour quelles altitudes l'incertitude relative sur son champ de gravitation g_0 varie de moins de 2%, ($\frac{|g_0 - g_z|}{g_0} \leq 2\%$). Pour cela, elle fait voler une sonde spatiale à l'altitude z de la surface d'une

planète . Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Altitude z (km) | 12,5 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| Champ gravitationnel g (N.kg ⁻¹) | 3,69 | 3,68 | 3,67 | 3,66 | 3,65 | 3,64 |

En te servant des informations ci-dessus et d'une démarche scientifique, aide VANELLE à résoudre les problèmes posés.

Consignes :

En utilisant l'approximation pour $\epsilon \ll 1$, on a $(1 + \epsilon)^n \approx 1 + n\epsilon$, on démontrera que pour z très petit devant le rayon R de la planète, g est une fonction linéaire de z ($g = g_0(1 - \frac{2z}{R})$), où g_0 est la valeur du champ de gravitation à la surface de cette planète.

- Echelle sur axes : 1cm pour 2,5km et 1cm pour 0,01N.kg⁻¹(graduer à partir de 3,60N.kg⁻¹).
- Tableau de quelques planètes et leur champ gravitationnel g₀

| Planètes internes | <i>Terre</i> | <i>Venus</i> | <i>Mercure</i> | <i>Mars</i> |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| $g_0 (\text{N.kg}^{-1})$ | 9,80 | 8,61 | 3,78 | 3,72 |